

Uripay

Flavoxate Hydrochloride BP

Composition:

Uripay 100 Tablet: Each film coated tablet contains Flavoxate Hydrochloride BP 100 mg.

Uripay 200 Tablet: Each film coated tablet contains Flavoxate Hydrochloride BP 200 mg.

Pharmacology: Uripay is a synthetic urinary tract spasmolytic. Flavoxate counteracts smooth muscle spasm of the urinary tract and exerts its effect directly on the muscle. It relaxes the muscles of the urinary tract.

Indication: Uripay is indicated for symptomatic relief of dysuria, urgency, nocturia, suprapubic pain, frequency and incontinence as may occur in cystitis, prostatitis, urethritis and urethrocystitis.

Dose & Administration: Adults and children over 12 years of age: Each tablet (100 mg to 200 mg) 3 times a day. With improvement of symptoms, the dose may be reduced.

Elderly patients: Should be taken careful.

Contraindication: Flavoxate is contraindicated in patients who have any of the following obstructive Conditions: Pyloric or duodenal obstruction, obstructive intestinal lesions or ileus, achalasia, gastrointestinal hemorrhage and obstructive uropathies of the lower urinary tract.

Warning & Precaution: Flavoxate should be given cautiously in patients with suspected glaucoma. Patients should be informed that if drowsiness and blurred vision occur, they should not operate a motor vehicle or machinery or participate in activities where alertness is required.

Side effects: Common: Gastrointestinal: Nausea, vomiting, dry mouth.

CNS: Vertigo, headache, mental confusion, especially in the elderly, drowsiness, nervousness.

Hematologic: Leukopenia (with is reversible upon discontinuation of the drugs.)

Rare: Cardiovascular: Tachycardia and palpitation.

Allergic: Urticaria and other dermatoses, eosinophilia and hyperpyrexia.

Ophthalmic: Increased ocular tension, blurred vision, disturbance in eye accommodation.

Use in Pregnancy & Lactation: Pregnancy Category B. This drug should be used during pregnancy only if clearly needed. It is not known whether this drug is excreted in human milk. Caution should be exercised when flavoxate is administered to a nursing woman.

Use in children & adolescents: Safety and effectiveness in children below the age of 12 years have not been established.

Drug Interaction: a) With medicine: Increased CNS effects with other sedative agents.

b) With Food and others: Alcohol can increase the nervous system side effects of flavoxate such as dizziness, drowsiness, and difficulty concentrating.

Overdose: The oral LD50 for flavoxate HCl in rats is 4273 mg/kg. The oral LD50 for flavoxate HCl in mice is 1837 mg/kg. It is not known whether flavoxate HCl is dialyzable.

Storage: Store below 30° C, protected from light and moisture. Keep away from the reach of the children.

Packing:

Uripay 100 Tablet: Each box contains 3 X 10's tablet in Alu-PVC blister strips.

Uripay 200 Tablet: Each box contains 2 X 10's tablet in Alu-PVC blister strips.



Manufactured by
Al-Madina Pharmaceuticals Ltd.
Tilargati, Tongi, Gazipur.

P-LF-017 (2)

ইউরিপে

ফ্ল্যভোক্সেট হাইড্রোক্লোরাইড বিপি

উপস্থাপনঃ

ইউরিপে ১০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেটে রয়েছে ফ্ল্যভোক্সেট হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১০০ মি. গ্রা.।

ইউরিপে ২০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেটে রয়েছে ফ্ল্যভোক্সেট হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২০০ মি. গ্রা.।

নির্দেশনাঃ

ফ্ল্যভোক্সেট একটি কৃত্রিম মূত্রতন্ত্রে সংকোচন নিরোধী। ফ্ল্যভোক্সেট সরাসরি মূত্রতন্ত্রের স্মৃথ মাসলে কার্যকরিতা প্রদর্শন করে এবং এর সংকোচন প্রতিরোধ করে। এটি মূত্রতন্ত্রের মাসলগুলো প্রসারিত করে। ফ্ল্যভোক্সেট ডিসইউরিয়া, আরজেনসিস, নকটিউরিয়া, সুপ্রাপিউবিক পেইন, ফ্লিকোয়েনসিস এবং ইনকন্টিন্যান্স এ নির্দেশিত। যেসব কারণে এ সমস্যাগুলো হয় সেগুলো হলো সিসটাইটিস, প্রোস্টাটাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, ইউরেথ্রোসিস্টাইটিস।

মাত্রা ও সেবন বিধিঃ

প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু যাদের বয়স ১২ বছরের উপরেঃ প্রতিটি ট্যাবলেট (১০০ মি. গ্রা. অথবা ২০০ মি. গ্রা.) দিনে ৩ বার। অবস্থার উন্নতি হলে মাত্রা কমানো যেতে পারে।

বয়োবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রতি নির্দেশনাঃ

নিম্নোক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে, ফ্ল্যভোক্সেট নির্দেশিত নয়। পাইলোরিক ভিওভেনাল অবস্ট্রাকশন, অবস্ট্রাকটিভ ইনটেস্টাইনাল লেসন্ অথবা ইলিয়াস, একেলাশিয়া গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল রক্তক্ষরণ এবং মূত্রতন্ত্রের নীচের অংশের অবস্ট্রাক্টিভ ইউরোপ্যাথিস।

সতর্কতা এবং সাবধাণতাঃ

সাসপেন্ডেড গ্লুকোমা রোগীদের ক্ষেত্রে এটি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াঃ

ক) সাধারণঃ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল : বমি বমি ভাব, বমি, মুখ শুষ্ক থাকা।

সিএনএসঃ মাথা ঘুরানো, মাথা ব্যথা, বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে কিমানো, ভীত।

হিম্যাটোলজিকঃ লিউকোপেনিয়া (যা ওষুধ বন্ধ করলে দূরীভূত হয়)।

খ) বিরলঃ কার্ডিওভাসকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এবং পালপিটেশন।

অ্যালার্জিকঃ আর্টিকারিয়া, ডার্মাটোসিস, ইউসিরনাকিলিয়া এবং হাইপারপাইরেসিয়া।

অপথ্যালমিকঃ অকিউলার চাপ বৃদ্ধি চোখ ঝপসা দেখা, চোখে ঝপসা দেখা, চোখের উপযোজন ব্যাঘাত।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহারঃ

প্রেগনেসি ক্যাটাগরি বি। যখন পরিষ্কার ভাবে এর ব্যবহার প্রয়োজন ঠিক তখনই এটি গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করা যাবে। এটি মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। মায়ের সাবধানতার সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারঃ শিশুদের ক্ষেত্রে (১২ বছরের কম) এর নিরাপত্তা ও কার্যকরিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ড্রাগ ইন্টারাকশনঃ

ক) মেডিসিনের সাথেঃ অন্যান্য সিডেটিভ উপাদানের সাথে গ্রহণ করলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়।

খ) খাদ্য ও অন্যান্যের সাথেঃ এলকোহল ও ফ্ল্যভোক্সেট এর সাথে গ্রহণ করলে স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া যেমন ব্রুমোনি, অবসাদ ভাব এবং মনস্থির ভাব।

মাত্রাধিকঃ ফ্ল্যভোক্সেট হাইড্রোক্লোরাইড ডায়ালাসিস হয় কিনা তা জানা যায় নি।

সংরক্ষণঃ

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে (৩০০ সে. তাপমাত্রা নীচে) রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহঃ

ইউরিপে ১০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট ব্রিস্টার স্ট্রীপে।

ইউরিপে ২০০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ২ X ১০ টি ট্যাবলেট ব্রিস্টার স্ট্রীপে।



প্রস্তুতকারক
আল-মদিনা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
তিলারি গাতি, টঙ্গী, গাজিপুর।

P-LF-017 (2)